

五、安全裝置

麻醉醫師根據兒童的年齡大於四歲可以溝通、體重、手術種類及身體狀況評估兒童是否適合使用，機器會設定安全間隔時間給藥，若在間隔時間內重複按藍色鈕，止痛器不會給藥，以避免藥物使用過量，在裝置過程中病童無法按壓可由父母協助按壓，並裝置監測機器密切觀察病童以確保用藥安全。

六、使用方式及期限

1. 手術後急性疼痛時使用。
2. 使用靜脈注射自控式止痛，每袋藥效期為3日，每一療程只能用6天。

七、費用

靜脈自控式止痛器、硬脊膜外腔自控式止痛都需要自費，健保不給付。

1. 第一次使用24小時內，價格6000元，(含技術費及血氧監測處置，材料及藥費)。
2. 使用24小時後，則每日收取費用1000元(含技術費及血氧監測處置，材料及藥費)直到停止使用為止。

自我評量(是非題)

- () 1. 裝自控式止痛器後，患者不需按壓任何按鈕，藥物會自動進入體內止痛。
- () 2. 裝自控式止痛裝置，如果感覺不舒服，要馬上通知醫護人員。

請寫下您的問題：

參考資料：

Miller's Anesthesia ,Ninth Edition,81,2614-2638,e5,Acute postoperative pain

制定日期：2016年10月

修訂日期：2023年9月(第三版)

編碼：6600-單張-中文-005-03

題號	1	2
解答	X	O

兒童自控式止痛使用說明書



麻醉部製作

諮詢專線：(04)7238595轉5311、5312

諮詢專線服務時間：

週一到週六 上午8：00-12：00

週一到週五 下午1：30- 5：30

讚美專線：(04)7238595轉3920

抱怨專線：(04)7238595轉3925

網址：http://www2.cch.org.tw/layout_1/index.aspx?id=3300



彰化基督教醫療財團法人
彰化基督教兒童醫院
CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
CHANGHUA CHRISTIAN CHILDREN'S HOSPITAL

麻醉部



一、什麼是自控式止痛呢？

此為緩解手術後急性疼痛之止痛設備，是將**自控式止痛器**接到兒童的身上，由止痛器控制給予藥物，當兒童感覺疼痛時或做出預期會發生疼痛動作，例如：翻身、下床、換藥等行為，可以在動作前5分鐘，按壓藍色按鈕給予一次劑量，以緩解兒童的疼痛。

二、兒童使用自控式止痛之優點：

1. 縮短疼痛時間。
2. 藥物劑量依兒童之需求而作調整。
3. 止痛效果穩定。
4. 控制疼痛後

，兒童可以早日下床活動，促進傷口復原。



三、操作方法

疼痛評估表



開始按壓



四、注意事項

1. 此項處置強調需在**意識清醒**，**感覺疼痛時**使用，**禁止家屬因兒童躁動而按壓**給藥。

2. 約15~20%病患可能出現**頭暈、噁心、嘔吐、皮膚癢**之情形，常發生於術後前幾天。若有此現象發生，可以依狀況調整劑量或使用止吐藥物即可減輕症狀。
3. 另有極少數病患有**嗜睡、呼吸緩慢**(每分鐘少於8次)之情形，若有此狀況發生，請立即通知病房護理師。
4. 使用自控式止痛不會影響傷口復原，對腸道蠕動影響很小，請安心使用。
5. 每天麻醉科的醫師叔叔及護理師阿姨會去病房關心你，並依據你的使用狀況做調整，若你有任何問題可以隨時提出來，和醫護人員討論。
6. 只限定在醫院內依醫師處方使用，不可私自帶出院外，如有遺失或損壞需照價並負法律之相關責任。
7. 病童使用自控式止痛期間需下床時，需有家屬在旁陪伴，避免發生跌倒事件。