

6. Cara penggunaan dan aturan :

Ini digunakan untuk nyeri otot akut pasca tindakan operasi

(1) Menggunakan injeksi intravena untuk menghilangkan rasa sakit yang dapat dikendalikan secara mandiri : setiap kantong obat memiliki efek durasi selama 3 hari, dan setiap pengobatan hanya dapat digunakan paling lama selama 6 hari.

7. Rincian Biaya :

Perangkat analgesik yang dapat dikendalikan secara mandiri oleh pasien ini tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan dan harus dibayar menggunakan biaya sendiri.

(1) Penggunaan alat injeksi intravena untuk analgesik yang dikendalikan secara mandiri: Harga untuk penggunaan pertama (dalam 24 jam) adalah sebesar 6000 yuan, (sudah termasuk biaya teknis, pemantauan oksigen dalam darah, biaya bahan dan obat-obatan). Apabila durasi penggunaan lebih dari 24 jam, maka biaya tambahannya adalah sebesar 1000 yuan per hari (sudah termasuk biaya

teknis, pemantauan oksigen dalam darah, biaya bahan dan obat-obatan) sampai penggunaannya dihentikan.

(2) Penggunaan alat epidural untuk analgesik yang dikendalikan secara mandiri: Harga untuk penggunaan pertama (dalam 24 jam) adalah sebesar 6000 yuan, (sudah termasuk biaya teknis, pemantauan oksigen dalam darah, biaya bahan dan obat-obatan). Apabila durasi penggunaan lebih.

Penilaian pribadi

- ()1. Dengan penggunaan alat analgesik yang dapat dikontrol secara mandiri, pasien tidak perlu menekan tombol PCA dan obat masih akan dapat masuk langsung ke dalam tubuh
- ()2. Dengan penggunaan alat analgesik yang dapat dikontrol secara mandiri, apabila pasien merasa tidak nyaman, harus segera melakukan pemberitahuan kepada petugas medis.

Silakan tulis pertanyaan Anda:

Referensi:

Miller's Anesthesia ,Ninth Edition,81,2614-2638,e5,Acute postoperative pain.

Tanggal diterbitkan: Bulan 11 Tahun 2016

Tanggal revisi: Bulan 08 Tahun 2024 Edisi 4

Kode: 6600-Selebaran-Mandarin-005-04

0	X	Jawaban
2	1	Nomor soal

Petunjuk penggunaan alat analgesik mandiri untuk anak-anak



Dikeluarkan oleh Departemen Anestesi

Layanan konsultasi: 04-7238595 ext. 5311,5312

Jam layanan konsultasi

Senin hingga jumat 08:00-16:00

Layanan penghargaan:04-7238595 ext 3920

Layanan pengaduan: 04-7238595 ext 3925

Website: //www.2.cch.org.tw/layout_1/index.aspx?id=3300



彰化基督教醫療財團法人
彰化基督教兒童醫院
CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
CHANGHUA CHRISTIAN CHILDREN'S HOSPITAL

Ketika Anda merasa cemas dan tidak berdaya, kami mendorong Anda untuk mengungkapkannya. Kami akan menemani Anda dalam mencari dukungan terkait serta dukungan fisik, mental, dan spiritual.

1. Apakah itu alat analgesik mandiri ?

Pasangkan *alat analgesik mandiri* ke tubuh anak, dan alat analgesik tersebut akan mengontrol pemberian obat pada saat anak merasakan nyeri (misalnya saat membalikkan badan, bangun dari tempat tidur, mengganti perban), anak dapat menekan tombol biru 5 menit sebelum rasa sakit kambuh lagi. jika tombol tidak ditekan, obat tidak akan diberikan.

2. Keuntungan kegunaan alat analgesik mandiri pada anak

- (1) Mempersingkat durasi rasa sakit
- (2) Dosis obat harus disesuaikan dengan kondisi anak
- (3) Efek analgesik yang lebih stabil
- (4) Setelah rasa sakitnya terkendali, anak dapat segera bangun dari tempat tidur dan bergerak, yang dapat mempercepat penyembuhan luka.



3. Cara pengoperasian:

Form penilaian rasa sakit

	10 Sangat sakit
	9
	8 Rasa sakitnya parah
	7
	6 Rasa sakit yang mengganggu
	5
	4 Rasa sakit yang tidak nyaman
	3
	2 Sedikit sakit
	1
	0 Tidak sakit

Mulai tekan tombol

4. Hal yang harus diperhatikan:

- (1) Tindakan ini seharusnya dilakukan pada saat pasien dalam kondisi sadar dan merasakan sakit. Dilarang menekan tombol karena alasan pasien mengalami gelisah.
- (2) Sekitar 15-20% pasien mungkin akan mengalami pusing, mual, muntah, dan gatal pada kulit, sering kali terjadi pada beberapa hari pertama setelah operasi. Jika gejala ini muncul maka dosis obat dapat disesuaikan kembali dengan situasi yang terjadi atau dapat menggunakan obat anti-mual untuk meredakan gejalanya
- (3) Pada sebagian kecil pasien, dapat mengalami rasa kantuk yang berlebih, pemapasan lambat (kurang dari 8 kali per menit). Apabila kondisi ini terjadi, harap segera hubungi perawat yang ada.
- (4) Penggunaan *alat analgesik mandiri* tidak berdampak pada proses penyembuhan luka dan hanya berdampak kecil pada pergerakan usus, jadi Anda bisa menggunakan alat ini dengan tenang.

- (5) Setiap harinya, dokter anestesi dan perawat akan mengunjungi Anda di ruang perawatan dan menyesuaikan ulang pengobatan berdasarkan kondisi penggunaan Anda. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat mendiskusikannya dengan petugas medis yang bersangkutan kapan saja.

5. Petunjuk keamanan alat:

Dokter anestesi akan melakukan evaluasi apakah alat tersebut aman digunakan oleh anak-anak berdasarkan batas usia 4 tahun ke atas, berat badan, jenis operasi, serta kondisi fisik. Mesin akan mengatur interval waktu yang aman untuk pemberian obat. Jika tombol biru ditekan berulang kali pada interval waktu yang telah ditentukan, maka alat analgesik akan berhenti memberikan obat untuk menghindari terjadinya overdosis. Selama proses pemasangan berlangsung, apabila anak tidak dapat menekan tombol sendiri karena keadaan sakit, maka dapat dibantu oleh orang tua pendamping. Selain itu, alat pemantau juga akan dipasangkan guna mengawasi anak serta memastikan keamanan dalam penggunaan obat.