


7. Pemantauan

Setiap hari, dokter anestesi dan perawat akan mengunjungi ruang perawatan untuk memantau kondisi pasien. Jika ada pertanyaan, pasien dapat berdiskusi dengan tim medis.



8. Biaya terkait

Perangkat analgesik yang dapat dikendalikan secara mandiri oleh pasien ini tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan dan harus dibayar menggunakan biaya sendiri.

(1) Penggunaan alat injeksi intravena untuk analgesik yang dikendalikan secara mandiri:

- Harga untuk penggunaan pertama (dalam 24 jam) adalah sebesar 6000 yuan, (sudah termasuk biaya teknis, pemantauan oksigen dalam darah, biaya bahan dan obat-obatan). Apabila durasi penggunaan lebih dari 24 jam, maka biaya tambahannya adalah sebesar 1000 yuan per hari (sudah termasuk biaya teknis, pemantauan oksigen dalam darah, biaya bahan dan obat-obatan) sampai penggunaannya dihentikan

(2) Penggunaan alat epidural untuk analgesik yang dikendalikan secara mandiri:

- Harga untuk penggunaan pertama (dalam 24 jam) adalah sebesar 6000 yuan, (sudah termasuk biaya teknis, pemantauan oksigen dalam darah, biaya bahan dan obat-obatan). Apabila durasi penggunaan lebih dari 24 jam, maka biaya tambahannya adalah sebesar 1000 yuan per hari (sudah termasuk biaya teknis, pemantauan oksigen dalam darah, biaya bahan dan obat-obatan) sampai penggunaannya dihentikan

ahkan tulis pertanyaan Anda:

Penilaian Pembelajaran Diri (Pertanyaan Benar/Salah)

- () 1. Dengan penggunaan alat analgesik yang dapat dikontrol secara mandiri, pasien tidak perlu menekan tombol PCA dan obat masih akan dapat masuk langsung ke dalam tubuh
- () 2. Dengan penggunaan alat analgesik yang dapat dikontrol secara mandiri, apabila pasien merasa tidak nyaman, harus segera melakukan pemberitahuan kepada petugas medis.

Referensi:

Miller, R.D., Eriksson, L.I., & Fleisher, L. (2020). Miller's Anesthesia. 9th. Churchill Livingstone Elsevier.

Tanggal diterbitkan: Bulan 8 Tahun 2006

Tanggal revisi: Bulan 08 Tahun 2024 (Edisi 14)

Kode: 6600-Selebaran-Mandarin-001-14

0	X	Jawaban
2	1	Nomor soal

Panduan Penggunaan Analgesik Mandiri (PCA)



Dikeluarkan oleh Departemen Anestesi

Layanan konsultasi: 04-7238595 ext. 5311, 5312

Jam layanan konsultasi

Senin hingga jumat 08:00-16:00

Layanan penghargaan: 04-7238595 ext 3920

Layanan pengaduan: 04-7238595 ext 3925

Website: www2.cch.org.tw/layout_1/index.aspx?id=3300



彰化基督教醫療財團法人
彰化基督教兒童醫院
CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
CHANGHUA CHRISTIAN CHILDREN'S HOSPITAL

Ketika Anda merasa cemas dan tidak berdaya, kami mendorong Anda untuk mengungkapkannya. Kami akan menemani Anda dalam mencari dukungan terkait serta dukungan fisik, mental, dan spiritual.

1. Apa itu alat analgesik yang ikendalikan secara mandiri?

Perangkat analgesik mandiri yang dapat dikendalikan pasien serta dipasang pada tubuh pasien, dan perangkat tersebut mengatur pemberian obat. Ketika pasien merasakan nyeri atau merasa akan mengalami nyeri (misalnya: saat berbalik, turun dari tempat tidur, atau mengganti perban), pasien dapat menekan tombol biru 5 menit sebelum rasa sakit terjadi. Dalam waktu singkat, efek analgesik akan terasa.

2. Keuntungan penggunaan alat analgesik yang dikendalikan secara mandiri oleh pasien

- (1) Memperpendek durasi rasa sakit.
- (2) Dosis obat disesuaikan dengan kebutuhan pasien.
- (3) Pasien dapat mengontrol sendiri, dengan efek analgesik yang lebih stabil
- (4) Setelah rasa sakit terkendali, pasien dapat bangun dari tempat tidur dan langsung bergerak, yang dapat mempercepat penyembuhan luka.



3. Cara penggunaan:



4. Hal yang perlu diperhatikan

- (1) Karena rasa sakit adalah pengalaman yang bersifat subjektif, pengendalian alat analgesik harus dilakukan oleh pasien sendiri untuk mencapai efek penghilang rasa sakit yang paling sesuai dengan kebutuhan pasien.
- (2) Prosedur ini harus dilakukan saat pasien sadar dan merasakan nyeri. **Dilarang bagi keluarga menekan tombol dikarenakan pasien merasa gelisah.**
- (3) Sekitar 15-20% pasien mungkin akan mengalami pusing, mual, muntah, dan gatal pada kulit, sering kali terjadi pada beberapa hari pertama setelah operasi. Jika gejala ini muncul maka dosis obat dapat disesuaikan kembali dengan situasi yang terjadi atau dapat menggunakan obat anti-mual untuk meredakan gejalanya.
- (4) Pada sebagian kecil pasien, **dapat mengalami rasa kantuk yang berlebih, pemapasan lambat (kurang dari 8 kali per menit). Apabila kondisi ini terjadi, harap segera hubungi perawat yang ada.**
- (5) Penggunaan **alat analgesik mandiri** tidak berdampak pada proses penyembuhan luka dan hanya berdampak kecil pada pergerakan usus, jadi Anda bisa menggunakan alat ini dengan tenang.
- (6) **Penggunaan perangkat ini hanya diperbolehkan di rumah sakit berdasarkan resep dokter. Tidak boleh dibawa pulang, dan jika perangkat hilang atau rusak,**

pasien harus mengganti dan bertanggung jawab secara hukum.

- (7) **Pasien harus ditemani oleh keluarga saat turun dari tempat tidur untuk menghindari terjadinya jatuh, dan ketika meninggalkan tempat tidur, pastikan untuk mencabut kabel dari mesin tanpa menariknya secara paksa.**

5. Petunjuk keamanan alat

Dokter Anestesi akan mengatur waktu interval yang aman pada mesin (sekitar 5 hingga 20 menit) berdasarkan usia pasien, berat badan, jenis operasi, dan kondisi fisik. Jika tombol biru ditekan berulang kali dalam interval waktu tersebut, perangkat analgesik mandiri tidak akan memberikan obat untuk menghindari penggunaan obat yang berlebihan dan memastikan keselamatan pasien.

6. Cara penggunaan dan aturan

Ini digunakan untuk nyeri otot akut pasca tindakan operasi.

- (1) Menggunakan injeksi intravena untuk menghilangkan rasa sakit yang dapat dikendalikan secara mandiri : setiap kantong obat memiliki efek durasi selama 3 hari, dan setiap pengobatan hanya dapat digunakan paling lama selama 6 hari.
- (2) Penggunaan alat epidural untuk analgesik : Karena ada risiko infeksi, penggunaan dibatasi hingga 3-5 hari.