

Nội dung chú ý dành cho người chăm sóc các bệnh vi sinh đa kháng thuốc

多重抗藥性菌株照顧者注意事項

【越文版】



Phòng Điều dưỡng biên soạn
Đường dây tư vấn : (04) 7256652
Thời gian phục vụ tư vấn qua điện thoại :
Thứ Hai ~ Thứ Sáu 8:00-12:00 sáng
Thứ Hai ~ Thứ Sáu 1:30-5:30 chiều
Đường dây khen ngợi : (04) 7238595 - 3920
Đường dây phản ánh : (04) 7238595 - 3925



彰化基督教醫療財團法人
彰化基督教醫院
CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL

一、Vi sinh đa kháng thuốc (MDRO) là gì ?

Vi sinh đa kháng thuốc , là các vi khuẩn gây bệnh thường gặp (bao gồm các vi khuẩn như: Staphylococcus aureus, trực khuẩn, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus..), các kháng sinh ban đầu có hiệu quả, sau khi trải qua nhiều quá trình diễn biến gây ra tính kháng thuốc đối với nhiều loại kháng sinh.

二、Phương thức truyền nhiễm

Vi khuẩn gây bệnh thông qua tiếp xúc mà chuyển dịch đến dịch cơ thể, dịch bài tiết, đờm, da và môi trường giường bệnh...., nhưng có thể thông qua các phương thức như rửa tay, đeo gang tay để ngăn chặn vi khuẩn lan truyền.

三、Nội dung cần chú ý dành cho người chăm sóc

- 1.Nếu thay người chăm sóc, xin hãy bàn giao rõ ràng nội dung cần chú ý.
- 2.Mong bạn hãy yên tâm, bệnh nhân đang trong quá trình điều trị
- 3.Trước và sau khi tiếp xúc bệnh nhân, xin hãy nhớ kỹ rửa tay bằng xà phòng hoặc cồn rửa tay khô.



- 4.Khi thay thuốc vết thương, thay bím hoặc hút đờm, người chăm sóc cần đeo khẩu trang, gang tay, để tránh tiếp xúc với dịch cơ thể, dịch bài tiết, đờm.. của bệnh nhân, sau khi kết thúc cần lập tức rửa tay.



5.Sau khi rửa tay, cần dùng nước xối rửa cả tay cầm của đầu vòi nước, để tránh tay rửa sạch bị lây nhiễm.



Sơ đồ miêu tả các bước cùng nhau rửa tay chính xác

- (Trong) 1.Lòng bàn tay
- (Ngoài) 2. Mu bàn tay
- (Kẹp) 3. Kẽ ngón tay
- (Cong) 4. Phía sau ngón tay
- (To) 5. Ngón tay cái
- (Dọc) 6. Đầu ngón tay .
- (Xong) 7.Kết thúc

Đề tự đánh giá (đề đúng sai)

- ()1.Vi sinh đa kháng thuốc (MDRO) có nghĩa là : chỉ vi khuẩn gây bệnh thường gặp, đối với kháng sinh ban đầu có hiệu quả, diễn biến gây ra tính kháng thuốc đối với nhiều loại kháng sinh .
- ()2.Có thể thông qua phương thức rửa tay, đeo gang tay để ngăn chặn vi khuẩn lan truyền.
- ()3.Khi thay thuốc vết thương, thay bỉm hoặc hút đờm, người chăm sóc không cần đeo khẩu trang và gang tay.

Mã số đề	1	2	3
Giải đáp	○	○	×

請寫下您的問題:

Hãy viết ra vấn đề của bạn

編碼：5736-單張-越文-057-03

越文翻譯日期：2023年7月

依據：5736-單張-中文-232-08

中文修訂日期：2023年7月