

◎拆線前傷口不可碰水，並暫時禁食刺激性食物如：煙、酒等，以利傷口癒合。

8. 乳房按摩

◎手術三天後開始作，增加乳房的柔軟度，讓乳房觸感自然。

◎手術後三個月內需早晚各按摩一次，每次最少十五分鐘，三至六個月時改每天按摩一次，半年後可採不定期按摩。

◎按摩方法，包括由側面壓、裡面推等各種角度。

9. 胸罩的穿著

◎術後一週內穿全罩式、無鋼絲胸罩，避免脫下來。

◎依醫師指示穿著，原則上六個月內勿穿有鋼絲胸罩，睡覺時不要穿，可讓乳房形狀自然。

□ 狐臭手術術後注意事項

1. 一週內傷口不要碰水。
2. 如有引流管請勿任意拔除，回診時由醫師拔除。
3. 一週內手臂不可舉高，避免做超過肩膀的動作。

自我評量(是非題)

- () 1. 未拆線前傷口應保持乾燥。
- () 2. 以棉枝沾生理食鹽水或煮沸過的冷開水擦拭傷口，再用棉枝擦乾後，取適量的外用藥膏塗抹，一天二至三次，直到拆線為止。

請寫下您的問題：

參考資料：

潘選(2016)。第21章 整形和重建手術。傅玲總校閱，手術全期護理(中)手術處置(14版，594-643頁)。台灣：愛思唯爾
蘇麗智等(2021)。傷口護理·實用基本護理學-下冊(第八版，563-600頁)·華杏。

制定日期：2003年8月

修訂日期：2024年6月(第九版)

編碼：5918-單張-中文-147-09

○	○	易擱
乙	↓	第第

重建整形暨手外科 術後護理須知



護理部製作

諮詢專線：(04)7238595轉5301

讚美專線：(04)7238595轉3920

抱怨專線：(04)7238595轉3925

網址：<https://www.cch.org.tw/knowledge.aspx?pID=1>



彰化基督教醫療財團法人
彰化基督教醫院
CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL

衛教天地



當您感到焦慮無助時，鼓勵您說出來，我們將陪伴您尋求相關支援及身心靈支持。

□抽脂手術術後注意事項

1. 二週後才能從事劇烈運動。
2. 避免吃太鹹的食物，以防水腫。
3. 腿部抽脂之患者，一個月內避免長時間站立，睡覺時將下肢墊高。
4. 初期會有腫脹、瘀血及痠痛現象，小範圍抽脂不影響上班，大範圍抽脂需休息二至三天，一般約二周後可恢復日常活動。
5. 在未拆線之前，患部應保持乾燥。
6. 如有放置引流管，需隔天回診移除。
7. 緊身衣最好穿半年的時間，且須密切與醫師配合定期作檢查，追蹤患部的變化。
8. 經常按摩患部，可使抽脂後的肌肉、皮膚均勻平滑。
9. 手術後勿抽煙、喝酒，避免辛辣刺激性食物，應適當的運動。

□眼瞼手術術後注意事項

1. 術後眼睛會腫一個禮拜，一個月之後就會很自然。
2. 以紗布包裹冰袋冰敷3天，每天至少5次，每次冰敷十五分鐘，休息五分鐘。

3. 三天後改用溫敷，可幫忙消腫。(冰袋放38-40度溫水中，即可變成溫敷袋。)
4. 以棉枝沾生理食鹽水或煮沸過的冷開水擦拭傷口，再用棉枝擦乾後，取適量的外用藥膏塗抹，一天二至三次。
5. 術後三天內傷口不要碰水。
6. 拆線後回家可洗臉碰水，但仍不可用力去揉，此時才可以配戴隱形眼鏡。
7. 術後一個月內不可做彎腰、瑜珈、倒立、取重物、大聲唱歌、憤怒等，會增加眼壓的動作。
8. 請按時服藥，若有劇烈疼痛，請儘速回診。

□一般手術

1. 術後傷口疼痛，可吃止痛藥緩解。
2. 注意傷口清潔，一星期內傷口不要碰到水，保持乾燥。
3. 以棉枝沾生理食鹽水或煮沸過的冷開水擦拭傷口，再用棉枝擦乾後，取適量的外用藥膏塗抹，一天二至三次，直到拆線為止。
4. 請依門診時間回診換藥或拆線。

□隆鼻術後注意事項

1. 術後會有幾天腫脹及瘀血，一至二週消腫，一至二個月外觀才能定型。
2. 前兩個禮拜不要戴普通眼鏡，術後一至二天可戴隱形眼鏡。
3. 請避免游泳、擤鼻涕。
4. 外觀如有移位，請儘速回診。

□隆乳手術術後注意事項

1. 由腋下植入義乳模型，傷口疼痛程度因人而異，3至5天後漸漸不痛。
2. 請按時服藥。
3. 術後胸部有彈性繃帶固定24-48小時。
4. 術後一個月即可趴睡。
5. 術後一週內避免碰撞，並限制雙臂過度用力，如提重物、抱小孩，或劇烈運動、三溫暖、游泳。雙臂需保持下垂姿勢。
6. 若有血腫、異常劇痛、乳房變硬，可先與主治醫師聯絡或回院就診。
7. 傷口照護
 - ◎如有引流管留置，通常1-3天回院由醫師拔除。
 - ◎傷口請擦優碘並覆蓋紗布，如對膠布過敏只擦優碘即可。