

10. 傷口加壓紗布球，請於 自行
移除。

□傷口換藥步驟－置放引流管：

1. 以無菌棉枝由非引流管端擠壓傷口至引流管端，將血水及滲液擠出。
2. 以無菌棉枝沾2%克菌寧殺菌水溶液由內往外環狀消毒傷口。
3. 以紗布覆蓋傷口，再以紙膠黏貼固定。
4. 換藥次數：一天1至2次，若傷口有滲濕或進水的情形立即換藥，直到拆線為止。
※備註：請勿拉扯引流管，若引流管不慎脫落請返院就醫。

□傷口換藥步驟－人工敷料：

1. 輕掀人工敷料的四個角落，再輕柔卸下舊的敷料，並觀察傷口。
2. 以無菌棉枝沾生理食鹽水由內往外環狀清潔傷口。
3. 再以無菌棉枝擦乾。
4. 貼上**新的人工敷料**。
5. 換藥時機：吸收傷口滲出液飽和時，此時即應更換敷料。
6. 沐浴時，請避免弄濕敷料及傷口。

自我評量(是非題)

- () 1. 未拆線前傷口應保持乾燥、清潔，若不小心進水或滲濕的情形立即換藥。
- () 2. 裝置人工血管的手臂勿過度的活動，如360度旋轉或提過重物品，避免人工血管移位。

請寫下您的問題：

參考資料：

黃月芳(2017)·傷口護理·實用基本護理學，(七版，492—532頁)·台北：匯華。
彰化基督教醫院護理部CW-5110-023植入式皮下注射器(Port-A)注射法及照護指引(2023-3-29)。

制定日期：2010年12月
修訂日期：2024年6月(第七版)
編碼：5918-單張-中文-148-07

○	○	是
乙	↓	是

一般外科門診 手術傷口照護須知



護理部製作

諮詢專線：(04)7238595轉5301

讚美專線：(04)7238595轉3920

抱怨專線：(04)7238595轉3925

網址：<https://www.cch.org.tw/knowledge.aspx?pid=1>



彰化基督教醫療財團法人
彰化基督教醫院
CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL

衛教天地



當您感到焦慮無助時，鼓勵您說出來，我們將陪伴您尋求相關支援及身心靈支持。

一般手術傷口照護之注意事項：

1. 回家當天請盡量休息。
2. 傷口可能有輕微疼痛的感覺，請按時服用由醫院帶回的藥。
3. 一星期內傷口不要碰到水，保持乾燥。若不小心弄溼時，請立即換藥以免傷口感染導致發炎。
4. 有以下情形發生，請回醫院處理：
 - ◎傷口血流不止
 - ◎傷口紅、腫、痛、有膿樣分泌物
 - ◎傷口裂開
5. 請依下列勾選的傷口換藥方式進行傷口換藥：（換藥前、後應洗手；用物須選用無菌棉枝、紗布）

□傷口換藥步驟－藥膏：

1. 以無菌棉枝沾生理食鹽水由內往外環狀清潔傷口。
2. 以無菌棉枝由內往外擦乾。
3. 以無菌棉枝沾適量的外用藥膏塗抹傷口。
4. 換藥次數：1天1至2次，若傷口有滲濕或進水的情形立即換藥，直到拆線為止。

□傷口換藥步驟－克菌寧：

1. 以無菌棉枝沾2%克菌寧殺菌水溶液由內往外環狀消毒傷口。
2. 以紗布覆蓋傷口。
3. 換藥次數：一天1次，若傷口有滲濕或進水的情形立即換藥，直到拆線為止。



□傷口換藥步驟－美容膠：

1. 以無菌棉枝沾2%克菌寧殺菌水溶液消毒在美容膠上。
2. 以紗布覆蓋傷口。
3. 換藥次數：一天1次，若傷口有滲濕或進水的情形立即換藥，直到傷口癒合。

※備註：美容膠不需每天更換，除非美容膠整片脫落或髒汙，貼上新的美容膠後再執行換藥步驟（步驟1－2）。



□皮下人工注射器術後注意事項

1. 手術後的傷口約3公分長，在傷口下方可以摸到鼓起圓形物的注射器。
2. 以無菌棉枝沾2%克菌寧殺菌水溶液在美容膠上消毒。
3. 以紗布覆蓋傷口。
4. 換藥次數：一天1次，若傷口有滲濕或進水的情形立即換藥，直到傷口癒合。
 - ※備註：美容膠不需每天更換，除非美容膠整片脫落或髒汙，貼上新的美容膠後再執行換藥步驟。
5. 傷口請保持乾燥，沐浴後請立即檢視敷料是否潮濕或進水。
6. 裝置人工血管的手臂勿過度的活動，如360度旋轉或提過重物品，避免人工血管移位。
7. 一般的日常生活並不受影響。
8. 如未定期進行化療時，每隔四週請自行掛號並依醫師指示執行沖管，以維持人工血管暢通。
9. 若發現傷口有裂開、血流不止、紅、腫、痛、化膿或發燒（體溫38度5以上），請立即回醫院處理。