

自我評量(是非題)

- () 1. 兩小時內患者應避免進食或飲用。
- () 2. 吞下膠囊72小時後，如果仍未排出膠囊請盡快聯繫您的主治醫師。

請寫下您的問題：

參考資料：

Small-bowel capsule endoscopy and device-assisted enteroscopy for diagnosis and treatment of smallbowel disorders_ European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Clinical Guideline Endoscopy 2015; 47: 352–376

制定日期：2014年4月


修訂日期：2024年3月（第五版）

編碼：5638-單張-中文-384-05

0	0	昱揚
2	1	皓龍

膠囊內視鏡檢查

(Capsule Endoscopy)



內視鏡中心製作

諮詢專線：(04)7238595轉5501

諮詢專線服務時間：

週一到週六 上午08：30-12：30

週一到週五 下午02：00-05：30

讚美專線：(04)7238595轉3920

抱怨專線：(04)7238595轉3925

網址：<https://www.cch.org.tw/knowledge.aspx?pID=1>

衛教單張



彰化基督教醫療財團法人

彰化基督教醫院

CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL

當您感到焦慮無助時，鼓勵您說出來，我們將陪伴您尋求相關支援及身心靈支持。

一、檢查目的：

診斷小腸出血或有潛藏病灶，如腫瘤、瘰肉、狹窄、發炎等病因。

二、檢查範圍及方式：

小腸包括十二指腸、空腸及迴腸。

三、檢查前注意事項：

1. 平時如果有口服降血壓、心臟科方面藥物，檢查當日請提早4個小時口服，**不需停藥**。
2. 檢查前須服用清腸劑以利檢查。
3. 檢查前一周停止服用鐵劑。
4. 進行檢查前兩小時前不宜服用藥。
5. 進行檢查前12小時要禁食，只可飲用開水，不可飲用其他有色飲料如牛奶、咖啡或奶茶等。
6. 受檢者如有裝置心臟節律器或植入式去顫器請務必告知開單醫師。

四、檢查時注意事項：

1. 受檢者身上會配戴接收器，檢查程序約12小時內完成。

2. 吞下膠囊後注意事項：

- (1) 吞下膠囊後，患者如果出現噁心，嘔吐或任何腹痛現象，請立即告知醫護人員進行處置。
 - (2) 兩小時內患者應避免進食或飲用任何飲料，兩小時後可適當飲用開水。
 - (3) 四小時後患者可開始食用一些輕食，檢查結束後則恢復正常飲食。
3. 檢查過程中，儘可能不要碰觸到接收器，此動作可能會造成資料遺失。
 4. 確認環境不會受到電磁場影響受檢者請勿使用手機。

五、檢查後注意事項：

吞下膠囊**72小時**後，**如果仍未排出膠囊請盡快聯繫您的主治醫師。**

若有任何不適或疑問，歡迎來電詢問！
內視鏡中心諮詢專線：

上班時間：8:30至17:00

連絡電話：04-7238595轉5501或5502