五、安全裝置

麻醉醫師會根據病患的年齡、體重、手術種類及身體狀況設定機器安全間隔時間(約5至20分鐘)，若在間隔時間內重覆按藍色鈕，止痛器不會給藥，以避免藥物使用過量，確保安全。


六、使用方式及期限

此為手術後急性疼痛之使用：

1. 使用靜脈注射自控式止痛：每袋藥效期為3日，每一療程以6天為限。
2. 使用硬脊膜外腔自控式止痛：因有感染之慮，使用以3~5天為限。

七、訪視

每日麻醉醫師及護理師會去病房探視，有任何問題可提出與醫護人員討論。



八、相關費用

病患自控式止痛器健保不給付，需自費。

1. 使用靜脈注射自控式止痛：第一次療程使用(24小時內)價格6000元，(含技術費及血氧監測處置，材料及藥費)。療程使用超過24小時，則每日再收取費用1000元(含技術費及SP02監測處置，材料及藥費)直到停止使用為止。
2. 使用硬脊膜外腔自控式止痛：第一次療程使用(24小時內)價格6000元，(含技術費及血氧監測處置，材料及藥費)。療程使用超過24小時，則每日再收取費用1000元(含技術費及SP02監測處置，材料及藥費)直到停止使用為止。

自我評量(是非題)

(　)1. 自控式止痛裝置後，患者不需按壓PCA，藥物也可以進入體內。

(　)2. 自控式止痛裝置後，病患如果感覺不適，須馬上通知醫護人員。

題號	1	2
解答	X	O

祝你手術順利、早日康復

制定日期：2006年8月
修訂日期：2019年11月（第十版）
編碼：6600-單張-中文-001-10

病患自控式止痛使用說明書



麻醉部製作

諮詢專線：(04)7238595轉5311、5312
諮詢專線服務時間：
週一到週五　08：00-16：00
讚美專線：(04)7238595轉3920
抱怨專線：(04)7238595轉3925

麻醉部

彰化基督教醫療財團法人
彰化基督教醫院
CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL

一、何謂病患自控式止痛

將病患自控式止痛器接到病患的身上，由止痛器控制給予藥物，當病患感覺疼痛時或預期會發生疼痛(例如：翻身、下床、換藥)之前5分鐘，按壓藍色按鈕，短時間內即會達到止痛效果。

二、病患自控式止痛之優點：

1. 縮短疼痛時間。
2. 藥物劑量依病患之需求而做調整。
3. 病患可自行控制，止痛效果穩定。
4. 控制疼痛後病患可早日下床活動，促進傷口復原。



三、操作方法



四、注意事項

1. 由於疼痛是主觀的感受，故止痛器應由病患自己操作以期達到最符合病患要求的止痛效果。
2. 此處置需在病患意識清醒，自感疼痛時使用，禁止家屬因病患躁動予以按壓。
3. 約15~20%病患可能出現頭暈、噁心、嘔吐、皮膚癢情形，若有發生，可依狀況調整劑量或使用止吐藥物減輕症狀。
4. 另有極少數病患有嗜睡、呼吸緩慢(每分鐘少於8次)現象，若有此狀況發生，請立即通知病房護理師。
5. 使用病患自控式止痛不會影響傷口復原，對腸道蠕動影響很小，請安心使用。
6. 只限定在醫院內醫師處方使用，不可私自帶出院，如有遺失或損壞需賠償並負法律之相關責任。
7. 使用期間需下床時要有家屬陪伴，避免病患跌倒事件。