自我評量(是非題)

(　)1. 適當做深呼吸、咳嗽、爬樓梯等活動以利肺擴張。

(　)2. 下床活動時，引流管應做適當固定，且引流袋勿高於腰部，以免引流液逆流回胸腔。

(　)3. 若有呼吸困難、胸悶胸痛或傷口出血腫脹等情形請立即告知醫護人員。

請寫下您的問題：

參考資料：

涂智彥、陳家弘、廖偉志、吳秉儒、鄭文建(2021)．*內科肋膜腔鏡操作指引*(一版)．合記。

制定日期：2017年12月

修訂日期：2024年3月（第五版）

編碼：5642-單張-中文-265-05

題號	1	2	2
解答	O	O	O

內科肋膜腔鏡檢查

肋膜腔鏡檢查圖

胸腔檢查治療中心製作

諮詢專線：(04)7238595轉3511

諮詢專線服務時間：

週一到週六 上午8：30-12：30

週一到週五 下午2：00- 5：30

讚美專線：(04)7238595轉3920

抱怨專線：(04)7238595轉3925

網址：https://www.cch.org.tw/knowledge.aspx?pID=1

衛教單張

彰化基督教醫療財團法人

彰化基督教醫院

CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION

CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL

當您感到焦慮無助時，鼓勵您說出來，我們將陪伴您尋求相關支援及身心靈支持。

一、前言：

內科肋膜腔鏡檢查

內視鏡經由胸壁切開之傷口進入肋膜腔，透過影像檢視是否有腫瘤或其它異常病變的存在同時觀察病變的性質及侵犯的程度。

二、適應症：

1.不明原因之肋膜積液。
2.肋膜腫瘤診斷。
3.肺癌併肋膜積液之分期。
4.瀰漫性或局部性肺病變之切片診斷。
5.肋膜沾黏術。
6.膿胸。

三、注意事項：

1.術後的傷口疼痛是不可避免的，視狀況配合醫囑給予止痛劑使用。
2.適當做深呼吸、咳嗽、爬樓梯等活動以利肺擴張，下床活動時，引流管應做適當固定，且引流袋勿高於腰部，以免引流液逆流回胸腔。
3.若引流管不慎脫出或斷裂，請馬上通知醫護人員。
4.引流管約3-5天可以拔除，須由醫師評估。
5.當您有呼吸困難、胸悶胸痛或傷口出血腫脹等情形請立即告知醫護人員。

四、鎮靜止痛返家注意事項：

鎮靜止痛藥物常見副作用，包括頭暈、嗜睡、噁心、反應遲鈍等，可能會持續數小時之久，因此受檢者務必遵守以下事項：

1.不可單獨開車或騎車回家，必須有家屬或朋友護送回家以確保安全。
2.回家後當天請盡量臥床休息，若下床活動時，需有人陪伴以預防跌倒。
3.不可從事操作機械之工作。
4.不可喝酒。
5.除了醫師處方藥外，儘量不再服用其它藥物。