





4 5 6
使用防水敷料 (Tegaderm) 覆蓋傷口及導管，黏貼前勿碰觸覆蓋範圍，並將導管固定於缺口處，再以防水敷料 (Tegaderm) 上的膠帶或紙膠，加強固定導管處。



7
使用別針固定於衣服下襬，以防管路拉扯滑脫。



自我評量 (是非題)

- () 1. 引流量異常增加或是引流出大量鮮紅色血液，可不需回診。
- () 2. 下床引流袋可擺放任何位置。
- () 3. 排空引流液時，引流袋口勿碰觸量杯，處理引流液前後要洗手。

請寫下您的問題：

參考資料：

彰化基督教醫院護理部品質管理-傷口換藥照護指引CW-5110-016 (2021-10-21修訂)

彰化基督教醫院護理部品質管理-引流管照護指引CW-5110-017 (2020-04-23修訂)

制定日期：2017年3月

修訂日期：2024年2月 (第四版)

編碼：5739-單張-中文-001-04

O	X	X	呈拋
3	2	1	第第

胸腹腔放液 引流管傷口照護



內科部胃腸肝膽科、內科超音波室製作

諮詢專線：(04)7238595轉3500

諮詢專線服務時間：

週一到週六 上午8：00-12：00

週一到週五 下午1：30- 5：30

讚美專線：(04)7238595轉3920

抱怨專線：(04)7238595轉3925

網址：<https://www.cch.org.tw/knowledge.aspx?PID=1>

衛教單張



彰化基督教醫療財團法人

彰化基督教醫院

CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL

當您感到焦慮無助時，鼓勵您說出來，我們將陪伴您尋求相關支援及身心靈支持。

一、傷口照護

1. 傷口照護對病患的重要性：

- (1) 減少不利傷口癒合的因素。
- (2) 了解傷口照顧應該注意的事項。
- (3) 預防傷口的惡化。
- (4) 了解如何預防傷口感染。

2. 傷口照護注意事項：

- (1) 保持傷口乾燥。
- (2) 以下為需告知護理人員的情況：
 - ◎固定傷口的膠帶過緊、鬆脫。
 - ◎紗布潮濕或滲血超過一半時。
 - ◎傷口有惡臭味或分泌物。

二、引流管照護

◎照護注意事項：

- (1) 多翻身及下床活動，以利引流液引流。
- (2) 下床活動時，使用安全別針固定於**衣服下擺**，將引流袋保持低於傷口部位，臥床時則平放於床上，**不可固定於床欄**，避免引流管壓迫及扭曲。
- (3) 如碰觸引流液後應立即洗手。
- (4) 如疼痛或傷口周圍滲濕等不適症狀，應通知護理人員。

三、引流管居家照護

1. 每日記錄引流液**顏色、味道、總量**，以利門診時醫師拔除引流管參考。
2. 當引流液達引流袋的**1/2-1/3**時，請排空引流袋；排空時，引流袋口**勿碰觸**量杯，處理引流液前後要洗手。
3. 應常檢查引流管接頭是否鬆脫、漏液。
4. 傷口較多滲液時，需使用紗布覆蓋，每日消毒更換，到傷口較乾燥時，再視情況改防水敷料(Tegaderm)使用。

有以下情況請立即返診


- ◎引流液顏色有異常改變，例如變混濁或黃、黑、褐等顏色之分泌物。
- ◎引流量異常增加或是引流出大量鮮紅色血液。
- ◎若引流量突然減少或無引流量，且有紗布滲濕情況，代表著引流管可能有阻塞情形，須回診檢查、治療。
- ◎劇烈的疼痛及嘔吐。
- ◎發燒或心跳加快。
- ◎引流袋破損時立即回院更換。

四、消毒及固定引流管流程圖




① 準備用物：

2%Chlorhexidine(或醫囑指定之沖洗溶液)、口腔棉棒、防水敷料(Tegaderm)、安全別針、紙膠、Y紗、4*4紗布。



② 以棉棒沾2%Chlorhexidine(或醫囑指定之沖洗溶液)，由內往外環形消毒導管周圍皮膚，避免來回擦拭。



③ 再輕提引流管，順管路消毒，待乾燥。或視傷口清潔情況增加消毒次數。