

自我評量(是非題)

- () 1. 鎮靜藥物尚未消退時，只能喝水，不能吃東西。
- () 2. 意識還沒完全清醒時，不可讓兒童獨處，並注意預防跌倒。

請寫下您的問題：

參考資料：

伍雁鈴、吳秋燕、張玉珠、劉棻(2015)．麻醉後病人之照護．手術室護理第三版．(396)．華杏。

制定日期：2022年9月（第一版）

編號：5736-單張-中文-480-01

題號	1	2
解答	X	O

兒童影像醫學 檢查鎮靜 注意事項



護理部製作

諮詢專線：(04)7256652

諮詢專線服務時間：

週一到週六 上午08：00-12：00

週一到週五 下午01：30-05：30

讚美專線：(04)7238595轉3920

抱怨專線：(04)7238595轉3925

網址：<https://www.cch.org.tw/knowledge.aspx?pid=1>

衛教單張



彰化基督教醫療財團法人
彰化基督教兒童醫院
CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
CHANGHUA CHRISTIAN CHILDREN'S HOSPITAL

一、使用鎮靜藥的目的：

為了讓檢查能順利進行，會給予無法配合檢查的兒童使用鎮靜藥物，讓兒童保持安睡狀態，以免因動來動去、哭鬧、無法安靜檢查而影響檢查結果。

二、鎮靜後注意事項

1. 當藥效開始作用時，病童若出現躁動不安，請將嬰幼兒抱好，不要讓病童走來走去，以免跌倒。
2. 用藥後約可睡2-3小時，藥效作用期間，絕對不可進食、也不可喝開水，以免噎到造成吸入性肺炎。
3. 鎮靜睡眠中，請觀察呼吸及膚色，若有異狀請立即告知醫護人員。
4. 兒童對藥物作用較敏感，可能會出現哭鬧、躁動不安，家屬不用擔心。

三、返家後注意事項：

1. 出現嗜睡、哭鬧不安、手脚無力，或是叫醒眼睛睜開又睡著，這是因藥效還沒完全消退，家長不用擔心，請持續觀察。
2. 意識還沒完全清醒時，不可讓兒童獨處，並注意預防跌倒。
3. 意識還沒完全清醒時，不可進食、也不可喝開水，以免噎到造成吸入性肺炎。
4. 清醒後，可先給10-20ml開水試喝，如果出現嘔吐，請延後1小時再試喝，等到兒童更清醒時，喝水不會嘔吐、吞嚥不會噎到，再從少量開始進食。
5. 若有任何問題，請於上班日（上午八點至下午八點半），撥打電話 (04)7238595 分機 3161 與影像醫部聯絡。