

(3) 手指抓住 Y 型紗布兩邊角，一塊開口向上，一塊開口向下蓋住傷口。



(4) 以膠布固定四周。再取一段紙膠將引流管固定於身體上，避免因拉扯而脫出。



三、注意事項

1. 傷口換藥次數與人工敷料請依醫師指示。
2. 當紗布有分泌物滲濕、滲血、弄髒或流汗導致紗布潮濕，應立即換藥。


3. 傷口未拆線或尚有引流管時，應採擦澡方式，維持傷口乾燥。
4. 棉棒碰觸到其他物品不可再使用。
5. 已拆封未用完之紗布棉枝及生理食鹽水，應予丟棄避免感染。
6. 有以下情形，應儘快返回醫院看診：



傷口紅、腫、熱、痛。



分泌物有膿(黃或灰綠)，有異味。



分泌物突然大量增加。



體溫超過38℃。

自我評量(是非題)

- () 1. 傷口敷料滲濕了不需要立即換藥，等時間到再換藥即可。
- () 2. 傷口有分泌物，如：膿、有異味應返回醫院看診。

參考資料：

劉芹芳、洪麗真、謝家如(2017)．皮膚系統疾病之護理．於劉雪娥總校閱，成人內外科護理下冊(七版，1052-1065頁)．台北：華杏。

制定日期：1991年4月

修訂日期：2018年10月（第十九版）

編碼：5736-單張-中文-150-19

題號	1	2
解答	X	O

傷口換藥須知



護理部製作

諮詢專線：(04)7256652

諮詢專線服務時間：

週一到週六 上午8：00-12：00

週一到週五 下午1：30- 5：30

讚美專線：(04)7238595轉3920

抱怨專線：(04)7238595轉3925

網址：www.cch.org.tw/knowledge/knowledge.aspx

衛教天地



JCI國際認證



SINCE 1896

彰化基督教醫院
CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL

給予『傷口換藥須知』護理指導及單張

編碼：5736-單張-中文-150-19

家屬/病人簽名

一、換藥之用物準備

1. 紗布、Y型紗布或棉墊(依醫師吩咐)
2. 無菌棉枝
3. 紙膠
4. 優碘藥水(開封保存6個月)
5. 生理食鹽水
6. 2%克菌寧殺菌水溶液(開封保存1個月)
7. 手套




備註

1. 生理食鹽水，開瓶後24小時未用完須丟棄，建議購買小瓶生理食鹽水。
2. 以上用物您可在本院5樓福利社購買。
3. 克菌寧殺菌水溶液勿與生理食鹽水混合使用，不可用於小孩及頸部以上的傷口。

二、換藥步驟



1. 換藥前後需洗手。
2. 移除舊紗布，並觀察紗布有無異常分泌物(膿、黃或綠色)或異味(必要時可戴手套)。
3. 沾取溶液(以不滴水為原則，棉枝一枝只能用一次)。
4. 以無菌原則進行傷口換藥。



※打開無菌單包
避免碰觸包裝
內面。

一般傷口換藥說明





- (1) 優碘消毒方法：
傷口有分泌物，先以生理食鹽水清潔，再以優碘消毒傷口，30秒後再用生理食鹽水清潔。(由內而外，環形消毒：勿在同一處來回擦拭。)

- (2) 克菌寧殺菌水溶液消毒方法：
以棉枝沾克菌寧由內而外消毒，勿在同一處來回擦拭。

- (3) 手指抓住紗布兩角，覆蓋住傷口。勿觸摸紗布中間部份，以免造成傷口感染。



引流管傷口換藥說明



- (4) 以紙膠固定四周，不可用拉扯方式黏貼，以免造成皮膚受損。

- (1) 優碘消毒方法：
以一手輕提引流管遠端，將沾優碘的棉枝，由內而外，環形擦拭，30秒後以沾生理食鹽水的棉枝再擦拭一次。

- (2) 克菌寧殺菌水溶液消毒方法：
將沾克菌寧的棉枝，由內而外，環形擦拭。