

羊膜穿刺術後須知

◎因此建議：

1. 建議抽血：必要時加驗血液培養(Bloodculture)2套、瀰漫性血管內凝血異常檢查(DIC profile)及其他。
2. 當有絨毛膜羊膜炎可能時，請立即給予抗生素治療，如下擇一：
(1) 三合一第一線：

Ampicillin 1 gm IV Q6H +
Gentamicin 80 mg IB Q8H +
Clindamycin 900 mg IB Q6H

(2) 第二線抗生素：

Unasyn 1.5gm IB Q6H
Augmentin 1.2 gm IV Q8H
Cefmetazole 1 gm IB Q6H

親愛的準媽媽，您好：

本院特別提供**胎兒高層次超音波篩檢**(自費)。

- ★適合週數21~24週。
- ★針對第二孕期胎兒器官構造篩檢。
- ★意者請先上網掛號後，並來電預約到診時間。
- ★洽詢專線：04-7238595分機7232。
- ★名額有限，歡迎及早約診。

自我評量(是非題)

- () 羊膜穿刺術後，若有發燒或畏寒、陰道出血或破水、劇烈腹痛、陰道多量液體分泌物流出等現象，須立即回診。

解答：O

請寫下您的問題：

參考資料：


陳迺紅(2015)・協助羊膜穿刺・李淑杏、陳迺紅、王淑芳、張淑文、黎小娟、周利娜、陳家盈、謝玉惠、金坤明，產兒科護理技術(四版，11-15頁)・華杏。

Davidson, M. R., London, M. L., & Ladewig, P.A.W. (2013)・婦嬰護理學：產科、婦科及婦女健康(孫吉珍、林宴如、方素櫻、蔡照文、潘怡如、曾櫻花、馮琪瑩、廖梅珍、張碧芬、吳惠娟、鍾詩琦、林玉蘭、郭淑瑜、林淑珊、盧玉瀛、張秀能、蘇婉麗、祁安美譯：二版)・華杏。(原著出版於2010)

制定日期：2006年8月

修訂日期：2021年2月(第三版)

編碼：5736-單張-中文-454-03



基因醫學部、護理部製作

諮詢專線：(04)7238595轉7244

諮詢專線服務時間：

週一到週六 上午8：30-12：00

週一到週五 下午1：30-05：30

諮詢專線(夜)：(04)7238595轉5491

讚美專線：(04)7238595轉3920

抱怨專線：(04)7238595轉3925

網址：[//www.cch.org.tw/knowledge/knowledge.aspx](http://www.cch.org.tw/knowledge/knowledge.aspx)



彰化基督教醫療財團法人

彰化基督教醫院

CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION

CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL



親愛的孕婦及家屬，您好：

羊膜穿刺是一種侵襲性檢查，檢查同意書說明，有少部份患者可能發生以下的副作用及併發症：

1. 2~3%有暫時性的陰道點狀出血現象。
2. 0.25~1.7%造成羊膜破裂。
3. 0.6%導致流產。
4. 約小於0.1%引起絨毛膜羊膜炎。
5. 約0.1%引起有生命危險的敗血性流產及敗血性休克。
6. 0.05~1.5%因穿刺而導致胎死腹中。
7. 早產、腹腔感染、早期子宮收縮的發生率也很低。
8. 其他偶發性病變，如：痙攣，下腹部不舒服，心臟填塞，羊水栓塞。

穿刺後需要注意什麼？

1. 穿刺處會以OK繃繃，晚上淋浴時取下即可，不需再黏貼。
2. 有些人會有輕微的子宮收縮，腹部針扎處輕微刺痛感，這些症狀大多會在1-2天內消失，因此當天應儘量多休

息。正常飲食，如有開藥(安胎藥或抗生素)，請依醫護人員指示按時服藥。

3. 返家後務必多休息、勿太勞累、久站久走、提重物(大於5公斤)、抱小孩。一星期内避免性行為、旅行、劇烈運動。

一、當妳出現下列症狀：

1. 發燒或畏寒。
2. 陰道出血或破水。
3. 劇烈腹痛。
4. 陰道多量液體分泌物流出可能是絨毛膜羊膜炎的早期症狀，延誤治療可能很快惡化成敗血性休克，請速聯絡。

二、聯絡方式：

1. 上班時間(8:00~17:00)

(1) 請直接聯絡檢查主治醫師。

電話：04-7238595轉總機
→轉_____醫師

(2) 直接聯絡婦產科超音波室。

電話：04-7238595轉7232。

2. 下班時間(17:00以後)

(1) 請先電話連絡產房，請醫護人員聯絡妳的主治醫師。

產房電話：04-7238595-5491

急診室電話：04-7238595-5191

(2) 請直接到急診室(一樓)或產房(四樓)，並請將此須知交給醫護人員，並告知妳曾接受羊膜穿刺，有敗血症可能。

親愛的彰基急診醫師，您好：

患者_____

於____年____月____日曾接受
羊膜穿刺，因下列症狀發生：

1. 發燒
2. 陰道出血
3. 劇烈腹痛
4. 陰道多量液體分泌物流出，疑似絨毛膜羊膜炎發生，**此感染可能快速惡化成敗血性流產及休克**。

**請立即聯絡檢查主治醫師或婦產部
值班醫師。**