四、導管沖洗方法：

目　　的：防止導管阻塞無法使用。
方　　法：以含抗凝劑(Heparin)的生理食鹽水沖洗管壁。
沖洗時間：1. 抽血前後
2. 給藥前後
3. 住院期間每7天沖洗並更換注射帽
4. 出院後(每星期返院沖洗並更換注射帽)

五、照護注意事項

1. 若傷口處有腫脹或疼痛、導管破裂或脫落等情形，需立即告知醫護人員。
2. 避免自行拆除傷口覆蓋處之物品或以手碰觸傷口。
3. 隨時保持傷口乾燥，如傷口弄濕或紗布滲血時，應告知護理人員。
4. 不建議游泳，以免傷口弄濕。
5. 若發現注射導管內有回血情形，請告知護理人員。
6. 建議採淋浴，避免導管傷口碰水；小兒若需盆浴，水勿超過Hickman水平。(注意：管口、管夾確實關閉，管口要朝下，以防水進入管內。)
7. 管子以別針固定在衣服上，避免牽扯注射導管，預防滑脫。
8. 沖洗管子後有任何不適，應馬上通知醫護人員，如咳嗽、呼吸短促、胸痛、發燒、寒顫、臉色潮紅等。

自我評量(是非題)

(　)1. 傷口換藥前、後應洗手。
(　)2. 傷口消毒直徑應該大於敷料面積的最大範圍。
(　)3. 病患應採盆浴，避免導管傷口碰水。

請寫下您的問題：

參考資料：
彰化基督教醫院護理部Hickman照護指引(2021年03月18日) 編號：CW-5110-034。

制定日期：2012年7月
修訂日期：2022年3月（第四版）
編碼：5736-單張-中文-372-04

題號	1	2	3
解答	O	O	X

喜克曼氏管【Hickman】照護注意事項



護理部製作

諮詢專線：(04)7256652
諮詢專線服務時間：
週一到週六　上午8：00-12：00
週一到週五　下午1：30- 5：30
讚美專線：(04)7238595轉3920
抱怨專線：(04)7238595轉3925
網址：https://www.cch.org.tw/knowledge.aspx?pID=1

衛教單張

彰化基督教醫療財團法人
彰化基督教醫院
CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL

一、什麼是喜克曼氏管(Hickman)？

喜克曼氏管（Hickman）屬於永久性血管通路，經由手術方式將導管植入鎖骨下靜脈，再經X光確定位置後可立即使用。導管開口端有 一、二、或三個分支，可用來抽血、給藥、輸液等，可減少重複打針、抽血之次數，增加病人之生活品質。





二、適用對象：

1.需長期給藥或注射點滴的病患。
2.骨髓細胞移植病患。
3.輸血病患。
4.營養補給、疼痛控制。
5.抽取血液樣本。
6.血液透析病患。

三、導管傷口換藥方法？

1.換藥用物準備：

(1) 酒精性2%Chlorhexidine殺菌液
(2) 75%酒精
(3) 棉枝
(4) 口罩2個
(5) 紙膠或透明防水黏貼膠膜(Tagadem)





酒精性2% Chlorhexidine 殺菌液




75%酒精

2.換藥步驟：



(1) 換藥前後需洗手（病人及家屬需戴口罩）



(2) 移除髒的透明防水黏貼膠膜(Tagadem)觀察傷口有無紅腫、分泌物、疼痛等現象。（視需要可戴手套）



(3) 先以75%酒精棉枝清潔傷口分泌物(注意：由中心向外環狀消毒：消毒直徑大於敷料面積)



(4) 再以酒精性2% Chlorhexidine殺菌液消毒傷口。(注意：由中心向外環形消毒；消毒直徑大於敷料面積；需用力擦拭)



(5) 待皮膚上消毒液乾燥(約30秒)，直接以透明防水黏貼膜(Tagadem)固定四周即可。

3.換藥時機：

＊依傷口覆蓋方式不同換藥時間不同：

傷口覆蓋方式	換藥時間
1.使用Tegaderm覆蓋	每7天換藥一次
2.使用紗布覆蓋	每2天換藥一次
3.Tegaderm下如有覆蓋紗布	每2天更換一次