

五、二合一抗結核藥(包含INH + RIF)

中文藥名：樂肺寧
英文藥名：Rifinah
150mg/錠劑



中文藥名：利肺
英文藥名：Rina
300mg/膠囊



注意事項 此藥為二合一抗結核藥，副作用及注意事項與上述標題一、二相同。

六、三合一抗結核藥(包含INH + RIF + PZA或EMB)

中文藥名：衛肺特；立剋核-3
英文藥名：Rifater；AkuriT-3



注意事項 此藥為三合一抗結核藥，副作用及注意事項與上述標題一、二、三、四相同。

七、四合一抗結核藥(包含INH + RIF + EMB + PZA)

中文藥名：立剋核-4
英文藥名：AKuriT-4



注意事項 此藥為四合一抗結核藥，副作用及注意事項與標題一、二、三、四藥物相同。

結核病

是一種可治癒的疾病，若早期接受治療、每天按時服藥及不任意停藥，幾乎有百分之百的治癒率。完成治療後，別忘了第一年的每半年需複查一次，之後每年複查一次。

自我評量(是非題)

- () 1. 肺結核病是一種不可治癒的疾病。
- () 2. 服藥期間並不是每個患者都會出現副作用，若出現症狀請立刻告知醫師。
- () 3. 服藥期間，可能會降低口服避孕藥效果，故需採其他避孕措施。

請寫下您的問題：

參考資料：

2022年衛福部疾管署結核病診治指引(第7版)

制定日期：2001年8月

修訂日期：2022年8月(第七版)

編碼：5736-單張-中文-167-07

題號	1	2	3
解答	X	O	O

肺結核藥物的副作用及服藥期間注意事項



護理部、藥學部製作

用藥諮詢專線：(04)7238595轉3157

諮詢專線服務時間：

週一到週六 上午8：00-12：00

週一到週五 下午1：30- 5：30

讚美專線：(04)7238595轉3920

抱怨專線：(04)7238595轉3925

網址：<https://www.cch.org.tw/knowledge.aspx?pid=1>



彰化基督教醫療財團法人
彰化基督教醫院
CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL

衛教單張



一、中文藥名：異菸鹼醯肼
英文藥名：Isoniazid(INH)



臨床用途	治療結核菌感染症
副作用	1. 肝炎或肝功能異常(約0.5~4%)。 症狀：疲倦、噁心、嘔吐、皮膚出現黃疸或食慾不振、腹部不適。
	2. 周邊神經病變(約2%)。 症狀：手足麻木、刺痛感。 ◎糖尿病、尿毒症及酒癮患者較易發生此症狀。 ◎若出現周邊神經病變，可配合維生素B6來改善症狀。
注意事項	3. 肝功能指數偏高但無症狀者(約10~20%)，未超過正常上限的五倍，則不需停藥，但需繼續追蹤肝功能。
	1. 若出現明顯或突發性食慾不振、全身倦怠，應停藥並立即回診。 2. 服藥期間請勿喝酒，因酒精會增加肝臟毒性。

二、中文藥名：立汎黴素
英文藥名：Rifampin(RIF)



臨床用途	治療結核菌感染症
副作用	包括皮膚紅疹、腸胃不適、少數出現皮膚黃疸、肝炎及血小板減少症等，嚴重時可能需停藥。
注意事項	1. 服藥期間請勿喝酒，因酒精會增加肝臟毒性。 2. 服用此服藥期間會使尿液、大便、唾液、痰、淚液變成橘紅色到紅棕色，此為正常現象，請安心服用。 3. 服藥期間應避免配戴隱形眼鏡，因會使隱形眼鏡變成橘紅色。

提醒您

服藥期間我們會定期抽血檢查，監測血液及肝、腎功能變化。

三、中文藥名：醫尚肺妥；醫肺必妥
英文藥名：Ethambutol(EMB)



臨床用途	治療結核菌感染症
副作用	1. 視神經炎 症狀：視覺模糊、眼部疼痛、紅綠色盲 2. 其他副作用： 腸胃不適、皮膚疹、發燒、尿酸升高。
注意事項	服藥期間若有感覺視力變差、模糊及辨色力混淆，請立即回診。

愛的小叮嚀

- ◎服藥期間並不是每個患者都會出現副作用，若出現症狀請立刻告知醫師。
- ◎抗結核藥可能會降低口服避孕藥的效果，服藥期間請採取其他避孕方式。

四、中文藥名："培力"匹井梭安錠
英文藥名：Pyrazinamide(PZA)



臨床用途	治療結核菌感染症
副作用	肝炎(約2~3%)。其它副作用包括：發燒、皮膚疹、關節疼痛、腸胃不適及尿酸升高
注意事項	請多喝水並攝取低普林飲食，暫不停藥也不使用降尿酸藥物。 (註：低普林飲食，若不清楚者可每星期一至五，時間8:30-17:00，電詢營養諮詢門診3231)

