



異常的導管位置



正常的導管位置



自我評量(是非題)

- () 1. 換液時間延長、引流量減少、水腫、體重增加，有可能是導管移位。
- () 2. 平時可以依自己生活作息，坐低於膝下的矮椅子。
- () 3. 排便不順不需告知醫師，避免吃一堆藥。

請寫下您的問題：

參考資料：

周哲毅(2022年11月12-13日)。腹膜透析導管與植入術〔在職教育訓練〕。2022第二十六梯次護理人員腹膜透析訓練班，台北市，台灣。

彰化基督教醫院腹膜透析室腹膜透析Twin bag換液技術操作指引(2023年5月23日)編號: CW-5959-17。

制定日期：2006年5月

修訂日期：2023年8月(第六版)

編碼：5959-單張-中文-005-06

~彰化基督教醫院 關心您~

題號	1	2	3
解答	O	X	X

腹膜透析患者 導管移位注意事項



腹膜透析室・護理部製作

諮詢專線：(04) 7238595 轉 7881

諮詢專線服務時間

週一至週五 8:00-17:30

週六 8:00-12:00

讚美專線：(04) 7238595 轉 3920

抱怨專線：(04) 7238595 轉 3925

腎臟科網址：www.cch.org.tw/nephro

衛教單張



彰化基督教醫療財團法人

彰化基督教醫院

CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL

一、前言：

正常情況下，外科醫師植入腹膜透析導管時，會將導管放置在膀胱直腸凹處。完成一次腹膜透析換液時間約需20~30分鐘，分別為注入時間約需要5至10分鐘，引流時間約需要10至20分鐘。



若發生導管移位，則引流時間會延長且會脫水差，造成水腫、毒素上升、嚴重時會有呼吸喘或透析不足的情形。所以，導管位置功能良好，是決定透析足夠的關鍵。

二、引起導管移位的原因：

- 1.便秘
- 2.雙腳不當彎曲
- 3.姿勢不良
- 4.網膜包覆

三、可能出現的症狀：

- 1.換液時間延長
- 2.引流量減少
- 3.水腫
- 4.體重增加



四、處理方式：

- 1.檢查開關、管夾是否打開。
- 2.檢查導管管路是否有扭結。
- 3.確認透析液是否灌入腹腔。
- 4.確認無以上問題請依以下方式：

先排氣後擠壓透析液袋，灌入少量透析液確認可以灌入，再打開白色引流管夾作引流，若仍未改善，則通知護理人員回院處理。

回院時會先作腹部X光攝影檢查，確定導管之位置，若導管移位則依醫囑：

- 1.給予軟便劑或瀉劑

- 2.教導墊腳尖之運動
- 3.若以上處理皆無法改善時，需外科執行腹腔鏡手術復位。

五、照護與注意事項：

- 1.平時保持大便通暢，無便秘情形。
- 2.平時引流時，可做墊腳尖的運動，預防導管移位。
- 3.日常生活中盡量勿長時間坐低於膝蓋的矮椅子，也不宜採盤坐或蹣腳。
- 4.隨時注意引流之情形，是否時間過長或引流液過少。
- 5.若引流異常時請與腹膜透析室護理師聯絡。

