

處理方式

1. **不可再更換透析液**，立即使用**小白夾**於破裂處**靠近身體端的導管處夾住**，並通知腹膜透析護理師。
2. 回院更換導管或輸液管。
3. 攜帶三袋透析液回院，依醫囑加入預防性抗生素治療，並需隨時注意引流液清澈度，若透析液混濁需立即回院。

自我評量(是非題)

- () 1. 透析引流液發現顏色異常，可以等下一袋換液時再看看，不需立即處理。
- () 2. 身上導管接頭輕微碰觸到衣服或手指，不需立即通知腹膜透析室護理師，自行更換小白帽即可。
- () 3. 新鮮透析液接頭分離了，才發現透析液未注入，可以再拿起來銜接注入。

請寫下您的問題：

參考資料：

曾進忠(2022年11月12-13日)。腹膜透析之感染合併症〔在職教育訓練〕。2022第二十六梯次護理人員腹膜透析訓練班，台北市，台灣。

周哲毅(2022年11月12-13日)。腹膜透析導管與植入術〔在職教育訓練〕。2022第二十六梯次護理人員腹膜透析訓練班，台北市，台灣。

彰化基督教醫院腹膜透析室腹膜透析緊急事件處理指引(2023年1月2日)編號: CW-5959-23。

制定日期：2006年5月

修訂日期：2023年8月（第六版）

編碼：5959-單張-中文-004-06

～彰化基督教醫院 關心您～

題號	1	2	3
解答	X	X	X

腹膜透析患者 緊急事件處理



腹膜透析室・護理部製作

諮詢專線：(04) 7238595 轉 7881

諮詢專線服務時間

週一至週五 8：00-17：30

週六 8：00-12：00

讚美專線：(04) 7238595 轉 3920

抱怨專線：(04) 7238595 轉 3925

腎臟科網址：www.cch.org.tw/nephro

衛教單張



彰化基督教醫療財團法人

彰化基督教醫院

CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL

正常的腹膜腔是屬於密閉狀態。但腹膜透析導管卻成了腹腔與外界的唯一通道。因此我們要請您注意，一旦發生以下事件您必須注意以防危害您的腹膜。

一、腹膜炎：

當發現引流液有混濁時。

處理方式

1. 立即通知腹膜透析護理師，**千萬不要認為下一次換液時，混濁情形會改善。**
2. 於注入完畢分離前，請先使用藍夾子夾住透析液Y型引流端。
3. 將此袋混濁引流液於2小時內帶回醫院檢查。



4. 另外再攜帶**四袋或數袋**透析液回院，需加抗生素**帶回依醫囑使用。**

二、接頭汙染

1. **身上的輸液管接頭：**碰觸到任何未經滅菌的東西(如：手、衣服、褲子、棉被等)可能會導致感染。



處理方式

不能再接上透析液，需立即套上新的小白帽，並通知腹膜透析護理師及回院更換身上的輸液管組(若輸液管組未到健保給付更換期限而汙染，輸液管組需自費)。

2. **新鮮透析液接頭：**碰觸到任何未經滅菌的東西(如：手、衣服、褲子、棉被等)，或已經分離又想起未注入或引流出，仍再拿起來銜接，這些動作都有可能導致感染。



處理方式

若未銜接前即汙染，則請再重新更換一袋新的透析液，重新操作換液技術；如果已經分離，又再拿起來銜接，則必須來電告知腹膜透析護理師，必要時需換管或使用預防性抗生素處理。

三、導管鬆脫：

指身上導管與輸液管之間的接連處鬆脫，可能會有少量透析液滲出而導致密閉狀態消失，進而細菌入侵腹腔而感染。



處理方式

1. 立即旋轉緊連接處，**不可再更換透析液**，使用小白夾將靠近身體端的導管處夾住，並通知腹膜透析護理師。
2. 攜帶三袋透析液回院，依醫囑加入預防性抗生素治療三天，並隨時注意引流液清澈度，若透析液混濁需立即回院。

四、導管破裂：

當身上導管(包括輸液管)破裂時，會有透析液滲出而感染。

